

## Неравенства для выпуклых многоугольников и многоугольники Рейнхардта\*

С. Б. Гашков

Пусть  $M_n$  — выпуклый  $n$ -угольник,  $p_n$  — его периметр,  $d_n$  — диаметр,  $b_n$  — ширина,  $R_n$  — минимальный радиус содержащего его круга (радиус Юнга),  $r_n$  — максимальный радиус лежащего в нем круга (радиус Бляшке),  $s_n$  — квадратный корень из его площади. Определения диаметра, ширины и обоих радиусов можно найти, например в [1], [2]. Справедливы следующие неравенства (индекс  $n$  опускаем), некоторые из которых также можно найти в [1], [2].

	$r$	$R$	$b$	$d$	$s$	$p$
$r$		$\frac{r}{R} > 0$	$\frac{r}{b} \geq \frac{1}{3}$	$\frac{r}{d} > 0$	$\frac{r}{s} > 0$	$\frac{r}{s} > 0$
$R$	$\frac{r}{R} \leq \cos \frac{\pi}{n}$		$\frac{b}{R} \leq \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}}$	$\frac{d}{R} \leq 2$	$\frac{s}{R} \leq \sqrt{\frac{n}{2} \sin \frac{2\pi}{n}}$	$\frac{p}{R} > 4$
$b$	$\frac{b}{r} \geq 2$	$\frac{b}{R} \geq 0$		$\frac{b}{d} > 0$	$\frac{b}{s} > 0$	$\frac{b}{p} > 0$
$d$	$\frac{r}{d} \leq \frac{\sin \frac{\pi}{2n}}{\operatorname{tg} \frac{\pi}{n}}$	$\frac{R}{d} \leq \sqrt{3}$	$\frac{b}{d} \leq \cos \frac{\pi}{2n}$		$\frac{s}{d} \leq \sqrt{\frac{n}{2} \cos \frac{\pi}{n} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}}$	$\frac{p}{d} \leq 2n \sin \frac{\pi}{2n}$
$s$	$\frac{s}{r} \geq \sqrt{n \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}}$	$\frac{s}{R} > 0$	$\frac{b}{s} \leq 3^{1/4}$	$\frac{s}{d} > 0$		$\frac{s}{p} > 0$
$p$	$\frac{p}{r} \geq 2n \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}$	$\frac{p}{R} \leq 2n \sin \frac{\pi}{n}$	$\frac{p}{b} \geq 2n \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}$	$\frac{p}{d} > 2$	$\frac{p}{s} \geq 2\sqrt{n \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}}$	

\*Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 05-01-0099, УР.04.02.528

Правое неравенство следующей теоремы было доказано в 1922 г. К. Рейнхардтом [3]. Здесь приводится более простое доказательство.

ТЕОРЕМА 1. Пусть  $p$  периметр,  $b$  ширина и  $d$  диаметр выпуклого  $n$ -угольника  $M$ . Тогда справедливы неравенства

$$2nb \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n} \leq p \leq 2nd \sin \frac{\pi}{2n}.$$

Каждое из неравенств точное, если  $n \neq 2^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $M^*$  — симметризация Минковского  $n$ -угольника  $M$ , т. е.

$$M^* = \frac{1}{2}(M + (-M)) = \{(x - y)/2 : x, y \in M\}$$

(все необходимые свойства этой операции можно найти в [2]). Тогда  $M^*$  есть центрально-симметричный выпуклый  $2m$ -угольник, где  $m \leq n$ , с теми же периметром, диаметром и шириной, что и у  $M$ . Из центральной симметричности  $M^*$  следует, что его внутренний радиус  $r^* = b/2$  и внешний радиус  $R^* = d/2$ . Из неравенства

$$2nr \operatorname{tg} \frac{\pi}{n} \leq p \leq 2nR \sin \frac{\pi}{n}$$

следует, что последовательность  $n \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}$  строго монотонно убывает, а последовательность  $n \sin \frac{\pi}{n}$  строго монотонно возрастает. Поэтому

$$\begin{aligned} 2nb \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n} &\leq \\ &\leq 2mb \operatorname{tg} \frac{\pi}{2m} = 4mr^* \operatorname{tg} \frac{\pi}{2m} \leq p \leq 4mR^* \sin \frac{\pi}{2m} = 2md \sin \frac{\pi}{2m} \leq \\ &\leq 2nd \sin \frac{\pi}{2n}, \end{aligned}$$

причем равенства  $p = 2nb \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}$ ,  $p = 2nd \sin \frac{\pi}{2n}$  лишь тогда справедливы, когда  $M^*$  есть правильный  $2n$ -угольник.

Очевидно, для правильного  $n$ -угольника при нечетном  $n$  справедливы равенства  $p = 2nb \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n} = 2nd \sin \frac{\pi}{2n}$ , а при четном  $n$  ни одно из них не верно. Однако при четном  $n$ , не равном степени двойки, указанные равенства могут достигаться.

Примеры  $n$ -угольников, для которых они достигаются, можно построить следующим образом. Представим  $n$  произвольным образом в виде  $m(2k + 1)$ . Очевидно, что если  $n = 2^s n_0$ , где  $n_0$  — нечетно, то число представлений в виде  $n = m(2k + 1)$  будет равно  $\tau(n_0)$  — числу всех различных делителей числа  $n_0$ . Возьмем правильный  $(2k + 1)$ -угольник с диаметром (наибольшей диагональю)  $d$  и с центром в каждой его вершине построим круг радиуса  $d$ . Очевидно, он будет проходить через

концы противоположащей к данной вершине стороны  $(2k + 1)$ -угольника, которая будет его хордой, отсекающей от него сегмент, соприкасающийся извне с  $(2k + 1)$ -угольником по этой стороне. Рассмотрим выпуклую фигуру, являющуюся пересечением построенных кругов. Очевидно, она будет получаться объединением  $(2k + 1)$ -угольника с указанными сегментами. Назовем ее правильным  $(2k + 1)$ -угольником Рело. Диаметр этой фигуры по-прежнему будет  $d$ , а периметр будет равен сумме дуг построенных кругов, т.е.  $\pi d$ , так как сложив эти дуги вместе, получим половину окружности радиуса  $d$ . Ширина этой фигуры во всех направлениях одинакова и равна  $d$ . Поэтому данная фигура является примером фигуры постоянной ширины. Впишем в нее  $n$ -угольник с равными сторонами так, чтобы среди его вершин содержались все вершины рассматриваемого  $(2k + 1)$ -угольника. Очевидно каждая из  $2k + 1$  упомянутых дуг при этом будет разбиваться на  $t$  равных дужек, хорды которых будут сторонами рассматриваемого  $n$ -угольника. Диаметр его будет очевидно  $d$ , а ширина равна  $b = d \cos(\pi/2n)$  — высоте равнобедренного треугольника с ребром  $d$  и углом при вершине  $\pi/n$ . Тогда периметр, очевидно, равен  $2nd \sin(\pi/2n) = 2b \operatorname{tg}(\pi/2n)$ .

Следующая теорема была доказана в 1922 г. К. Рейнхардтом [3]. Здесь приводится более простое доказательство.

**ТЕОРЕМА 2.** Пусть  $p$  периметр,  $s^2$  площадь и  $d$  диаметр выпуклого  $n$ -угольника  $M$ . Тогда справедливо неравенство

$$\frac{s}{d} \leq \sqrt{\frac{n}{2} \cos \frac{\pi}{n} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}},$$

которое обращается в равенство только для правильных нечетноугольников.

**ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.** Из неравенств

$$\frac{p}{s} \geq 2\sqrt{n \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}}, \quad p \leq 2nd \sin \frac{\pi}{2n}$$

следует неравенство

$$\frac{s}{d} \leq \sqrt{\frac{n}{2} \cos \frac{\pi}{n} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}},$$

которое, очевидно, обращается в равенство только когда оба неравенства обращаются в равенства. Но для второго из них это верно только в случае правильного  $n$ -угольника, а для первого из них в этом случае равенство возможно, лишь когда  $n$  нечетно.

В следующей теореме более подробно рассматривается случай обращения неравенств теоремы 1 в равенства.

ТЕОРЕМА 3. Пусть  $R(n)$  есть наибольшее число попарно не подобных  $n$ -угольников Рейнхардта, т. е. таких, что выполнены равенства

$$2nb \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n} = p = 2nd \sin \frac{\pi}{2n}.$$

Тогда

$$(i) \quad R(n) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad n = 2^k, \quad k \in \mathbb{N};$$

для любого  $n \in \mathbb{N}$

$$(ii) \quad \frac{1}{2n} \sum_{2 \nmid m|n} 2^{n/m} (\varphi(m) - \mu(m)) \leq R(n) < \frac{1}{2n} \sum_{2 \nmid m|n} 2^{n/m} \varphi(m);$$

для  $n = 2^l p^k$ ,  $k, l \in \mathbb{N}$ , где  $p > 2$  — простое число,

$$(iii) \quad \begin{aligned} R(n) &= \frac{1}{2n} \sum_{2 \nmid m|n} 2^{n/m} (\varphi(m) - \mu(m)) = \\ &= \frac{1}{2n} (2^{n/p} p + 2^{n/p^2} p(p-1) + \dots + 2^{n/p^k} p^{k-1} (p-1)) \sim 2^{n/p} p / 2n; \end{aligned}$$

$$(iv) \quad R(n) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad n = p \text{ или } n = 2p, \quad p > 2, \quad p - \text{простое.}$$

Здесь  $\varphi(n)$  — функция Эйлера,  $\mu(n)$  — функция Мёбиуса,  $m \mid n$  — обозначение для отношения делимости натуральных чисел (определения см., например, в [4]).

Пункт (iv) дает следующую геометрическую характеристику простых чисел: нечетное число  $n$  является простым, если и только если  $R(n) = 1$ , т. е. если существует единственный  $n$ -угольник Рейнхардта. Аналогично получается и вторая характеристика: нечетное число  $n$  является простым если и только если  $R(2n) = 1$ , т. е. если существует единственный  $2n$ -угольник Рейнхардта.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть  $M$  такой  $n$ -угольник, что  $M^*$  — правильный  $2n$ -угольник. Ориентируем все стороны многоугольника  $M^*$  в одном направлении и сопоставим им вектора, изображающие комплексные корни  $2n$ -й степени из единицы  $1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{2n-1}$ , где  $\varepsilon = \exp \frac{i\pi}{n}$ . Ясно, что  $-\varepsilon^j = \varepsilon^{n+j}$ . Тогда сторонам  $n$ -угольника  $M$  однозначно сопоставляется  $n$ -элементное множество, также обозначаемое  $M$ , лежащее в группе корней из единицы  $W_{2n} = \{1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{2n-1}\}$ . Если расположить векторы этого множества в определенном порядке так, чтобы начало очередного вектора совпало с концом предыдущего, то они будут ограничивать  $n$ -угольник, подобный  $n$ -угольнику  $M$ . Если расположить векторы аналогичным

образом, но в противоположном порядке, получится многоугольник, симметричный предыдущему относительно некоторой прямой. Естественно, центрально-симметричному многоугольнику  $(-M)$  соответствует множество  $(-M)$  такое, что  $M \cap (-M) = \emptyset$ . Ясно, что условия  $M \cap (-M) = \emptyset$  и  $M \cup (-M) = W_{2n}$  равносильны. Они равносильны также тому, что в каждой паре противоположных векторов  $\{\varepsilon^j, -\varepsilon^j\}$  один принадлежит  $M$ , а другой принадлежит  $-M$ . Также очевидно, что

$$\sum_{\varepsilon^j \in M} \varepsilon^j = 0,$$

так как сумма векторов, в которые превращаются ориентированные в одном направлении стороны многоугольника, равна нулю. Расположение векторов в любом другом порядке, хотя и имеет всегда сумму, равную нулю, приводит к невыпуклому или самопересекающемуся многоугольнику.

Обозначим через  $A_n$  множество

$$\{M : M \subset W_{2n}, |M| = n, M \cap (-M) = \emptyset\}$$

(здесь и далее  $|M|$  обозначает число элементов множества  $M$ ).

Так как из каждой пары  $\{\varepsilon^j, -\varepsilon^j\}$  только один элемент принадлежит  $M$ , то  $|A_n|$  равно  $2^n$ . Обозначим через  $A_n^*$  подмножество  $A_n$ , состоящее из таких множеств  $M$ , для которых сумма входящих в них векторов равна нулю. Обозначим  $A_{n,m}$  подмножество

$$\{M : M \in A_n, |\text{Aut } M| = m\},$$

где группа  $\text{Aut } M = \{w : w \in W_{2n}, M = Mw\}$ . С геометрической точки зрения  $\text{Aut } M$  есть группа вращений, переводящих множество  $M$  в себя. Если  $|\text{Aut } M| = m$ , то  $m \mid 2n$  и эта группа

$$\text{Aut } M = \{1, \varepsilon^{2n/m}, \varepsilon^{4n/m}, \dots, \varepsilon^{2n-2n/m}\},$$

т.е. состоит из поворотов на углы  $2k\pi n/m$ ,  $k = 0, \dots, m-1$  (поворот на нулевой угол — это тождественное преобразование). Так как множество  $M \in A_{n,m}$ ,  $m > 1$  переходит в себя при нетривиальном повороте вокруг начала координат, то сумма его векторов равна нулю, иначе бы она изменялась при этом повороте. Алгебраическое доказательство этого также уместается в несколько строк. Действительно, если  $M \in A_{n,m}$ ,  $m > 1$ ,  $x \in \text{Aut } M$ ,  $x \neq 1$ , тогда

$$\sum_{\varepsilon^j \in M} \varepsilon^j = \sum_{x\varepsilon^j \in M} x\varepsilon^j = x \sum_{\varepsilon^j \in M} \varepsilon^j = x \sum_{\varepsilon^j \in M} \varepsilon^j,$$

следовательно

$$(1-x) \sum_{\varepsilon^j \in M} \varepsilon^j = 0, \quad \sum_{\varepsilon^j \in M} \varepsilon^j = 0,$$

поэтому

$$\sum_{\varepsilon^j \in M} \varepsilon^j = 0$$

и  $M \in A_n^*$ . Значит  $A_{n,m}$  содержится в  $A_n^*$ , т. е.  $A_{n,m}$  можно было определить равенством

$$\{M : M \in A_n^*, |\text{Aut } M| = m\}.$$

Если  $m$  четное число, то  $-1 = \varepsilon^{(2n/m)(m/2)} \in \text{Aut } M$ , т. е. указанная группа содержит поворот на 180 градусов (центральную симметрию), поэтому в этом случае  $-M = M$ . Но по условию это невозможно, так как  $M \cap (-M) = \emptyset$  для  $M \in A_{n,m}$ , следовательно  $A_{n,m} = \emptyset$  при четных  $m$ .

Если же  $m$  нечетно, делит  $n$  и  $M \in A_{n,m}$ , то рассмотрим подмножество

$$M_m = M \cap \{1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{\frac{2n}{m}-1}\}.$$

Ясно, что

$$|M_m| = n/m, \quad (-M)_m = \left(M_m + \frac{n}{m}\right) \bmod \frac{2n}{m}, \quad M_m \cap (-M)_m = \emptyset,$$

ведь

$$\varepsilon^{2n/m} M = M, \quad \varepsilon^{n/m} M = \varepsilon^{n/m} (\varepsilon^{2n/m})^{(m-1)/2} M = -M.$$

Удобно вместо множества

$$M_m = \{\varepsilon^{k_1}, \dots, \varepsilon^{k_{n/m}}\}$$

рассматривать множество  $M_m = \{\varepsilon^{mk_1}, \dots, \varepsilon^{mk_{n/m}}\} \subset W_{2n/m}$ . Тогда

$$|M_m| = n/m, \quad M_m \cap (-M)_m = \emptyset, \quad |\text{Aut } M_m| = 1,$$

ведь из условия  $|\text{Aut } M_m| = k > 1$  следовало бы, что  $|\text{Aut } M| = mk > m$  в противоречии с условием  $M \in A_{n,m}$ . Поэтому  $M_m \in A_{n/m,1}$ . Указанное выше отображение  $M \leftrightarrow M_m$  взаимно однозначно, поэтому справедливо равенство

$$|A_{n,m}| = |A_{n/m,1}|.$$

Следовательно

$$|A_n| = \sum_{2 \nmid m|n} |A_{n,m}| = \sum_{m|n_0} |A_{n,m}| = \sum_{m|n_0} |A_{n/m,1}|,$$

где  $n_0$  максимальный нечетный делитель  $n$ , т. е.  $n = n_0 2^s$ ,  $s = 0, 1, \dots$

Если положить  $f_k = |A_{kn/n_0}| = (2^k)^{n/n_0}$ ,  $g_k = |A_{kn/n_0,1}|$ ,  $k \in \mathbb{N}$ , то для нечетных  $k$  получим, что

$$f_k = |A_{kn/n_0}| = \sum_{m|k} |A_{(kn/n_0)/m,1}| = \sum_{m|k} g_{k/m}.$$

Применяя преобразование Мёбиуса (см. [4]), имеем

$$g_k = \sum_{m|k} \mu(m) f_{k/m} = \sum_{m|k} \mu(m) (2^{k/m})^{n/n_0} = \sum_{m|k} \mu(m) 2^{kn/(mn_0)}$$

для нечетных  $k$ , следовательно

$$|A_{n,1}| = g_{n_0} = \sum_{m|n_0} 2^{n/m} \mu(m).$$

Любопытно, что если  $n$  нечетно, то

$$\frac{|A_{n,1}|}{n} = \frac{1}{n} \sum_{m|n} 2^{n/m} \mu(m)$$

равно числу неприводимых двоичных многочленов степени  $n$  (формулу для их числа см. в [4]). Известна также связь этого числа с количеством непериодических двухцветных ожерелий из  $n$  бусинок. Произвольное двухцветное ожерелье из  $n$  бусинок назовем  $n/k$ -периодическим, если его можно разрезать на  $k$  одинаковых подвесок. Ожерелья, которые не являются  $k$ -периодическими ни при каком  $k$ , назовем непериодическими и их количество обозначим  $I_n$  (ожерелья, получающиеся друг из друга вращением в содержащей их плоскости, считаем одинаковыми). Очевидно, что число ожерелий с минимальным периодом  $k$  равно  $I_k$ . Разрезая разными способами каждое из таких ожерелий, получаем  $k$  различных двухцветных ориентированных подвесок. Общее количество подвесок, полученных из всех ожерелий, равно с одной стороны

$$\sum_{d|n} d I_d,$$

а с другой стороны равно  $2^n$ . Поэтому по формуле Мёбиуса (см. [4])

$$I_n = \frac{1}{n} \sum_{m|n} 2^{n/m} \mu(m).$$

Это число, очевидно, равно  $|A_{n,1}|/n$  при нечетных  $n$ .

В [5, гл. 1, задача 27] доказано также, что число  $I_n$  при нечетных  $n$  равно числу подмножеств аддитивной циклической группы  $\mathbb{Z}_n$ , таких, что сумма элементов во множестве равна нулю.

Если для некоторого  $w \in W_{2n}$  и двух  $n$ -элементных множеств  $M_1, M \in A_n$  справедливо равенство  $M_1 = Mw$  в группе  $W_{2n}$ , то эти множества назовем эквивалентными. Другими словами, два множества  $M$  и  $M_1$  эквивалентны, если одно из них получается поворотом из другого. В частности,  $M$  и  $-M$  эквивалентны. Очевидно, что если  $M \in A_{n,m}$ , и  $M_1$  эквивалентно  $M$ , то  $M_1 \in A_{n,m}$ , поэтому множество  $A_{n,m}$  распадается

на непересекающиеся классы эквивалентности. Если  $M \in A_{n,m}$ , то число различных множеств, которые можно получить поворотами множества  $M$ , равно  $2n/m$ . Значит, в каждом классе  $2n/m$  множеств и поэтому число классов эквивалентности в  $A_{n,m}$  равно  $|A_{n,m}|m/2n$ . Геометрически любое разбиение  $W_{2n}$  на пару множеств  $M$  и  $-M$  можно представить в виде ожерелья из равного количества черных и белых бусинок, в котором при повороте на 180 градусов меняются цвета всех бусинок. Если  $M \in A_{n,m}$ , то это ожерелье будет  $2n/m$ -периодическим. Эквивалентным множествам соответствуют ожерелья, получающиеся друг из друга вращениями. Если такие ожерелья считать одинаковыми, то каждому классу эквивалентности соответствует одно ожерелье и число классов эквивалентности равно числу различных ожерелий. Если множества  $M$  и  $M_1$  эквивалентны, то соответствующие им многоугольники Рейнхардта получаются друг из друга поворотами, т. е. равны. Очевидно, что не эквивалентным множествам соответствуют не равные друг другу многоугольники Рейнхардта.

Ясно, что существует множество  $M \in A_{n,1}$  со свойством  $\sum_{\varepsilon^j \in M} \varepsilon^j \neq 0$  (например, множество  $\{1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1}\}$ ). Поэтому

$$R(n) < \sum_{m|n_0} |A_{n,m}| \frac{m}{2n} = \sum_{m|n_0} |A_{n/m,1}| \frac{m}{2n} = \sum_{m|n_0} \sum_{k|n_0/m} 2^{n/mk} \mu(k),$$

так как  $n/m = 2^s n_0/m$ . Меняя порядок суммирования и подставляя  $k = l/m$ , имеем

$$R(n) < \frac{1}{2n} \sum_{l|n_0} 2^{n/l} = \sum_{m|l} m \mu(l/m) = \frac{1}{2n} \sum_{l|n_0} 2^{n/l} \varphi(l),$$

так как

$$\sum_{m|l} m \mu(l/m) = \varphi(l).$$

Так как разным ожерельям соответствуют разные  $n$ -угольники Рейнхардта, то

$$\begin{aligned} R(n) &\geq \\ &\geq \sum_{1 < m|n_0} |A_{n,m}| \frac{m}{2n} = \sum_{m|n_0} |A_{n,m}| \frac{m}{2n} - \frac{|A_{n,1}|}{2n} = \frac{1}{2n} \sum_{l|n_0} 2^{n/l} (\varphi(l) - \mu(l)) = \\ &= \frac{1}{2n} \sum_{2 \nmid m|n} 2^{n/m} (\varphi(m) - \mu(m)) \end{aligned}$$

и соотношения (ii) доказаны.



Заметим, что при нечетном  $n$

$$\sum_{1 < m | n_0} |A_{n,m}| \frac{m}{2n} = \sum_{1 < m | n} |A_{n/m,1}| \frac{m}{2n}$$

равна половине числа всех периодических двухцветных ожерелий из  $n$  бусинок.

Пусть  $n = 2^s p^k$ ,  $s, k = 0, 1, \dots$ , где  $p$  — простое число,  $M \in A_n$  и

$$\sum_{\varepsilon^j \in M} \varepsilon^j = 0.$$

Подставляя  $-\varepsilon^{j-n}$  вместо  $\varepsilon^j$  при  $j \geq n$  в предыдущее равенство, имеем

$$\sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j \varepsilon^j = 0,$$

где  $\alpha_j = \pm 1$ ,  $j = 0, \dots, n-1$ . При этом ясно, что

$$\alpha_j = 1 \Leftrightarrow \varepsilon^j \in M, \quad \alpha_j = -1 \Leftrightarrow \varepsilon^j \in (-M).$$

Пусть

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \alpha_j x^j,$$

и  $f_{2n}$  есть полином деления круга (определение и свойства см. в [4]). Тогда  $P(\varepsilon) = 0$ , и так как  $f_{2n}$  минимальный полином для  $\varepsilon$ , то согласно свойству минимальных полиномов он будет делителем полинома  $P(x)$ . Если  $p = 2$ , то  $n = 2^l$ , следовательно  $f_{2n} = x^n + 1$  и поэтому  $f_{2n}(x)$  не может делить  $P(x)$ , так как степень  $P(x)$  меньше  $n$ . Следовательно,  $R(n) = 0$  и равенство (i) доказано.

Рассмотрим случай  $p > 2$ ,  $n = 2^s p^k$ . Для круговых полиномов известны соотношения

$$f_p(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}; \quad f_{2p}(x) = f_p(-x) = 1 - x + x^2 - \dots + x^{p-1};$$

$$f_n(x) = f_{p_1 \dots p_s} \left( x^{p_1^{r_1-1} \dots p_s^{r_s-1}} \right),$$

где  $n = p_1^{r_1} \dots p_s^{r_s}$ . Из них следует, что

$$f_{2n} = 1 - x^{n/p} + x^{2n/p} - \dots + x^{n(1-1/p)}, \quad n = 2^s p^k.$$

Так как

$$\frac{P(x)}{f_{2n}(x)} = \sum_{j=0}^{n/p-1} a_j x^j,$$

где  $a_j$  — целые числа, то

$$P(x) = f_{2n}(x) \frac{P(x)}{f_{2n}(x)} = f_{2n}(x) \sum_{j=0}^{n/p-1} a_j x^j = \sum_{j=0}^{n/p-1} \sum_{k=0}^{p-1} (-1)^k x^{\frac{n}{p}k+j}.$$

Отсюда следует, что последовательность  $\alpha_j$  антипериодична с периодом  $n/p$ , т. е.  $\alpha_{j+n/p} = -\alpha_j$ ,  $j = 0, \dots, n-1-n/p$ . Так как

$$\alpha_j = 1 \Leftrightarrow \varepsilon^j \in M, \quad \alpha_j = -1 \Leftrightarrow \varepsilon^j \in (-M),$$

то

$$\varepsilon^j \in M \Leftrightarrow \varepsilon^{j+n/p} \in (-M), \quad j = 0, \dots, n-1-n/p,$$

следовательно  $\varepsilon^j \in M \Leftrightarrow \varepsilon^{j+2n/p} \in M$ ,  $j = 0, \dots, 2n-1$ , ведь  $\varepsilon^{j+n} = -\varepsilon^j$ . Поэтому  $\varepsilon^{2n/p} \in \text{Aut } M$ ,  $|\text{Aut } M| > 1$ , значит  $M \notin A_{n,1}$  и множество  $A_{n,1}$  пусто. Следовательно,

$$R(n) = \sum_{1 < m | n_0} |A_{n,m}| \frac{m}{2n} = \frac{1}{2n} \sum_{2 \nmid m | n} 2^{n/m} (\varphi(m) - \mu(m))$$

и равенство (iii) доказано. В частности,  $R(n) = 1$ , если  $n = p$  или  $n = 2p$ , где  $p > 2$  — простое число. Если  $n = 2^s p$ ,  $s \geq 2$ , тогда согласно (iii)

$$\begin{aligned} R(n) &= \frac{1}{2n} \sum_{2 \nmid m | n} 2^{n/m} (\varphi(m) - \mu(m)) = \frac{1}{2n} 2^{n/p} (\varphi(p) - \mu(p)) = \\ &= \frac{1}{2^{s+1}} 2^{2^s} = 2^{2^s-s-1} \geq 2, \end{aligned}$$

так как  $2^s \geq s+2$  для  $s \geq 2$ .

Если  $1 < p \leq \sqrt{n}$  делит  $n$ , то для  $n > 4$

$$\begin{aligned} R(n) &\geq \frac{1}{2n} \sum_{2 \nmid m | n} 2^{n/m} (\varphi(m) - \mu(m)) > \frac{1}{2n} 2^{n/p} (\varphi(p) - \mu(p)) = \\ &= \frac{1}{2n} 2^{n/p} (p-1+1) = \frac{p}{2n} 2^{n/p} \geq 2^{\sqrt{n}-1} / \sqrt{n} \geq 1, \end{aligned}$$

так как  $2^x/x$  возрастающая функция при  $x \geq 2$ , и  $2^{\sqrt{n}} \geq 2\sqrt{n}$  при  $n \geq 4$ . Следовательно,  $R(n) = 1$  только когда  $n$  простое число, и пункт (iv) доказан.

Доказанная теорема дает примеры многоугольников Рейнхардта, которые нельзя получить из правильных  $(2k+1)$ -угольников Рело. Это очевидно при сравнении полученных нижних оценок для  $R(n)$  и оценки  $\tau(n_0)$  числа  $n$ -угольников Рейнхардта — Рело. Если  $n$  не равно ни степени двойки, ни простому, ни удвоенному простому числу, то из доказанных неравенств следует асимптотическое неравенство  $2^{n/p} p / 2n \lesssim R(n)$ , где  $p$  —




Рис. 1.




Рис. 2.

минимальный нечетный простой делитель  $n$ . Из него следует, что  $\tau(n_0) \leq \tau(n) \leq 2\sqrt{n} \lesssim 2\sqrt{n-1}/\sqrt{n} \lesssim R(n)$ , т. е.  $R(n)$  в рассматриваемых случаях растет существенно быстрее  $\tau(n)$ . Минимальное значение  $n$ , при котором  $R(n) > \tau(n_0)$ , равно 15. В этом случае

$$R(15) \geq \frac{2^5 3 + 2^3 5 + 2(2 \cdot 4 - 1)}{30} = 5.$$

Из 5 этих 15-угольников один правильный и еще два нам уже известны как 15-угольники Рейнхардта – Рело, один из которых строится на базе 5-угольника, а другой — на базе треугольника Рело. Покажем для примера, как описанный в доказательстве метод позволяет построить еще два многоугольника Рейнхарда с нетривиальной группой вращений. Вначале рассмотрим случай, когда эта группа содержит 15 вращений. Тогда, очевидно, существует только правильный 15-угольник Рейнхардта. Если группа содержит 5 вращений, то соответствующее множество  $M$  может иметь только вид

$$\{1, \varepsilon, \varepsilon^2, \varepsilon^6, \varepsilon^7, \varepsilon^8, \varepsilon^{12}, \varepsilon^{13}, \varepsilon^{14}, \varepsilon^{18}, \varepsilon^{19}, \varepsilon^{20}, \varepsilon^{24}, \varepsilon^{25}, \varepsilon^{26}\}$$

и соответствует 5-периодическому ожерелью, изображенному на рис. 1.

В рассматриваемом случае 15-угольник можно построить на базе пятиугольника Рело.

Если группа содержит 3 вращения, то множество  $M$  может совпадать с множеством

$$\{1, \varepsilon, \varepsilon^2, \varepsilon^3, \varepsilon^4, \varepsilon^{10}, \varepsilon^{11}, \varepsilon^{12}, \varepsilon^{13}, \varepsilon^{14}, \varepsilon^{20}, \varepsilon^{21}, \varepsilon^{22}, \varepsilon^{23}, \varepsilon^{24}\}$$

которое соответствует 3-периодическому ожерелью, изображенному на рис. 2.

В этом случае 15-угольник можно построить на базе треугольника Рело. Однако множество  $M$  можно выбрать еще двумя способами. Один




Рис. 3.




Рис. 4. 15-угольник Рейнхардта




Рис. 5.




Рис. 6. Другой 15-угольник Рейнхардта

из них соответствует множеству

$$\{1, \varepsilon, \varepsilon^2, \varepsilon^4, \varepsilon^8, \varepsilon^{10}, \varepsilon^{11}, \varepsilon^{12}, \varepsilon^{14}, \varepsilon^{18}, \varepsilon^{20}, \varepsilon^{21}, \varepsilon^{22}, \varepsilon^{24}, \varepsilon^{28}\},$$

которое изображается 3-периодическим ожерельем на рис. 3.

Соответствующий 15-угольник Рейнхардта изображен на рис. 4.

Во втором случае в качестве  $M$  выбирается множество

$$\{1, \varepsilon, \varepsilon^3, \varepsilon^4, \varepsilon^7, \varepsilon^{10}, \varepsilon^{11}, \varepsilon^{13}, \varepsilon^{14}, \varepsilon^{17}, \varepsilon^{20}, \varepsilon^{21}, \varepsilon^{23}, \varepsilon^{24}, \varepsilon^{27}\},$$

которое изображается 3-периодическим ожерельем на рис. 5.

Соответствующий 15-угольник Рейнхардта изображен на рис. 6.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Шклярский Д. О., Ченцов Н. Н., Яглом И. М. *Геометрические оценки и задачи из комбинаторной геометрии*. М.: Наука, 1974.
- [2] Яглом И. М., Болтянский В. Г. *Выпуклые фигуры*. М.: ГИТТЛ, 1951.
- [3] Reinhardt K. *Extremal Polygone gegebenen Durchmesser // Jber. Deutsch. Math.-Vereinig. Bd. 31, 1922. S. 251–270.*
- [4] Кострикин А. И. *Основные структуры алгебры*. М.: Физматлит, 2000.
- [5] Стенли Р. *Перечислительная комбинаторика*. М.: Мир, 1990.

ИЗДАТЕЛЬСТВО МЦНМО

В. О. Бугаенко. **Обобщенная теорема Ван дер Вардена.** 2006. 12 с.

Брошюра адресована старшим школьникам и студентам младших курсов. Никаких предварительных знаний от читателя не требуется.

Н. Я. Виленкин, А. Н. Виленкин, П. А. Виленкин. **Комбинаторика.** (Совместно с издательством «ФИМА».) 2006. 400 с.

В книге в популярной форме рассказывается о комбинаторике, методах решения комбинаторных задач, о рекуррентных соотношениях и производящих функциях. Книга будет полезна школьникам старших классов, интересующимся математикой, учителям, студентам первых курсов математических факультетов университетов и пединститутов, а также всем, сталкивающимся с комбинаторными задачами.

А. Ю. Зубов и др. **Олимпиады по криптографии и математике.** 2006. 136 с.

В сборник включены условия, ответы и решения пятнадцати олимпиад по криптографии и математике, проведенных в Москве с 1991 по 2005 гг. Для учащихся старших классов, учителей математики и информатики, а также студентов младших курсов, интересующихся вопросами информационной безопасности.

**Московские олимпиады по информатике.** Под ред. Е. В. Андреевой, В. М. Гуровица и В. А. Матюхина. 2006. 256 с.

Книга предназначена для школьников, учителей информатики, студентов и просто любителей решать задачи по программированию. Большинство задач приведены с подробными разборами и комментариями.

В. В. Прасолов. **Задачи по планиметрии.** 5-е изд. испр. и доп. (совместно с ОАО «Московские учебники») 2006. 640 с.

Ставший классическим сборник содержит около 1900 задач с полными решениями и около 150 задач для самостоятельного решения. 4-е издание этой книги вышло в 2001 году. При перенаборе текста третьего издания возникло огромное количество опечаток. В 5-м издании эти опечатки исправлены. В новое издание добавлено около 200 задач. Добавлена также новая глава 31, посвященная эллипсу, параболе и гиперболе.

В. В. Прасолов. **Элементы теории гомологий.** 2006. 448 с.

Эта книга является непосредственным продолжением книги «Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии». В книге приведено много задач (с решениями) и упражнений для самостоятельного решения. Для студентов старших курсов и аспирантов математических и физических специальностей; для научных работников.

У. Фултон. **Таблицы Юнга и их приложения к теории представлений и геометрии.** Пер. с англ. под ред. А. М. Вершика. 2006. 328 с.

Книга посвящена комбинаторным свойствам таблиц Юнга и их приложениям. Для студентов, аспирантов и научных сотрудников.

А. В. Шаповалов. **Принцип узких мест.** 2006. 24 с.

Книга посвящена поиску решения нестандартных математических задач. Книга адресована всем любителям интересных задач, в первую очередь — школьникам старших классов, а также учителям и руководителям математических кружков.

А. Н. Ширяев. **Задачи по теории вероятностей.** 2006. 416 с.

Настоящее учебное пособие содержит более 1500 задач (включая подзадачи), непосредственно «привязанных» к учебнику автора в двух книгах «Вероятность. Т. 1» и «Вероятность. Т. 2» (2004 г.) и упорядоченных в соответствии с содержанием этих книг. Пособие рассчитано на студентов физико-математических специальностей. Может служить учебным пособием для аспирантов и справочным пособием для специалистов.

---

---