


## Решения задач из прошлых выпусков

15.3. Условие. Гипербола  $H = \{(x, y) : xy = 1\}$  повёрнута на угол  $\alpha$  относительно начала координат  $(0; 0)$ ; получилась гипербола  $H_\alpha$ . Найдите угол между их касательными в точках пересечения  $H$  и  $H_\alpha$ .

(A. B. Акопян, D. Schleicher)

Ответ.  $180^\circ - 2\alpha$ .

Решение. Возьмём точку  $A$  на гиперbole. При повороте она может перейти в одну из точек на гиперболе, находящихся на том же расстоянии от начала координат (см. рисунок). Так как при повороте на  $180^\circ$  гипербола переходит сама в себя, достаточно рассмотреть только случай, когда совмещаются точки  $A$  и  $B$ , т. е.  $\angle AOB = \alpha$ . Обозначим через  $\varphi$  острый угол между  $OA$  и касательной к гиперболе в точке  $A$ . Из симметрии относительно прямой  $x = y$  следует, что острый угол между



прямой  $OB$  и касательной в точке  $B$  также равен  $\varphi$  и противоположно ориентирован, поэтому ответ равен  $2\varphi$ . Осталось выразить  $\varphi$  через  $\alpha$ .

Пусть  $y = kx$  — уравнение прямой  $OA$ . Тогда  $(1/\sqrt{k}, \sqrt{k})$  — координаты точки  $A$ . Подставляя  $x = 1/\sqrt{k}$  в формулу для производной  $y' = -1/x^2$ , получаем, что угловой коэффициент касательной в точке  $A$  равен  $-k$ , а значит, касательная и прямая  $OA$  образуют равные углы с осью  $OX$ .

Угол между  $Ox$  и прямой  $OA$  равен (из симметрии)  $(90^\circ - \alpha)/2 = 45^\circ - \alpha/2$ , поэтому  $\varphi = 90^\circ - \alpha$  и ответ равен  $180^\circ - 2\alpha$ .

(И. В. Митрофанов)

**16.8. Условие.** Даны два подмножества в  $\mathbb{Z}_2^n$ :  $A$  и  $B$ . Известно, что  $|A| + |B| > 2^k$ . Докажите, что  $|A + B| \geq 2^k$ . (Здесь  $A + B$  — это сумма Минковского двух множеств.) (Д. Г. Фон-дер-Флаасс)

**Решение.** Будем доказывать утверждение задачи индукцией по  $k$ . База  $k = 1$  очевидна.

Будем говорить, что координата *разделяет* множество двоичных векторов, если в этом множестве есть как векторы, у которых эта координата равна 0, так и векторы, у которых она равна 1. Если среди координат нет такой, которая разделяет и  $A$  и  $B$ , то координаты делятся на два типа: одинаковые для любого вектора из  $A$  и одинаковые для любого вектора из  $B$ . Тогда все суммы Минковского попарно разные, а значит, их количество равно  $|A| \cdot |B| \geq 1 \cdot 2^k = 2^k$ .

Теперь предположим, что одна из координат (не умаляя общности, первая) разделяет как  $A$ , так и  $B$ . Обозначим  $A_0$  множество всех векторов из  $A$ , у которых первая координата равна 0. Аналогично определим  $A_1$ ,  $B_0$  и  $B_1$ .

Либо  $|A_0| + |B_0| > 2^{k-1}$ , либо  $|A_1| + |B_1| > 2^{k-1}$ . Аналогично либо  $|A_0| + |B_1| > 2^{k-1}$ , либо  $|A_1| + |B_0| > 2^{k-1}$ . Не умаляя общности, пусть

$$|A_0| + |B_0| > 2^{k-1}, \quad |A_0| + |B_1| > 2^{k-1}.$$

По предположению индукции  $|A_0 + B_0| \geq 2^{k-1}$  и  $|A_0 + B_1| \geq 2^{k-1}$ . Далее, у всех векторов из  $A_0 + B_0$  первая координата равна 0, а у векторов из  $A_0 + B_1$  она равна 1, поэтому эти две суммы Минковского не пересекаются и  $|A + B| \geq |A_0 + B_0| + |A_0 + B_1| \geq 2^k$ .

(И. В. Митрофанов)

**28.2. Условие.** Любой ли трёхгранный угол имеет сечение, являющееся правильным треугольником? (Фольклор)

**Ответ.** Не любой.

**Решение.** Предположим, что любой трёхгранный угол имеет сечение, являющееся правильным треугольником. Можно считать (применив гомотетию), что сторона этого треугольника равна 1. Тогда можно также считать, что для всех трёхгранных углов это один и тот же треугольник  $ABC$ .

Рассмотрим замыкание  $M$  множества точек, из которых стороны  $AB$  и  $AC$  видны под углами, не меньшими  $\pi - \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  — заданное положительное число. Ясно, что  $A \in M$ .

Возьмём трёхгранный угол, в котором  $AB$  и  $AC$  принадлежат плоским углам, равным  $\pi - \varepsilon$ , а третий плоский угол равен  $\varepsilon$ . Тогда вершина трёхгранного угла  $O$  принадлежит  $M$ .

Устремим теперь  $\varepsilon$  к нулю. Множество  $M$  в пределе сводится к точке  $A$ . Значит,  $O \rightarrow A$ . Так как отрезок  $BC$  виден из  $O$  под углом  $\varepsilon$ , из  $A$  он должен быть виден под нулевым углом, что неверно.

**Замечание.** На самом деле наше рассуждение показывает, что для любого треугольника найдётся трёхгранный угол, не имеющий подобного ему сечения.  
*(А. Я. Канель-Белов, Б. Р. Френкин)*