

Выпуклая геометрия I

Задача 8.1. Пусть C — матрица перехода от базиса e_1, \dots, e_n к базису e'_1, \dots, e'_n пространства V .

Найдите матрицу перехода между сопряжёнными к ним базисами пространства V^* .

Задача 8.2. Докажите, что если V бесконечномерно, то пространства V и V^* неизоморфны.

Задача 8.3. а) Докажите, что множество $C \subset A(V)$ выпукло тогда и только тогда, когда вместе с любыми точками x_1, \dots, x_k оно содержит симплекс $\Delta(x_1, \dots, x_k)$.

б) Пусть $(C_i)_{i \in I}$ — набор выпуклых множеств в $A(V)$. Докажите, что $\text{conv}(\bigcup_{i \in I} C_i)$ совпадает с множеством всех выпуклых комбинаций вида $\lambda_1 x_{i_1} + \dots + \lambda_k x_{i_k}$, где $x_{i_j} \in C_{i_j}$.

Задача 8.4. Убедитесь явно, что относительная внутренность симплекса непуста.

Задача 8.5. Верно ли, что выпуклая оболочка замкнутого множества замкнута?

Задача 8.6 (сумма Минковского). Для множеств $S_1, S_2 \subset A(V)$ множество

$$S_1 + S_2 := \{x_1 + x_2 : x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$$

называется их *суммой Минковского*. Докажите следующие свойства:

- а) $\text{conv}(S_1 + S_2) = \text{conv } S_1 + \text{conv } S_2$ для любых S_1, S_2 ;
- б) если C_1, C_2 — выпуклые множества, то $C_1 + C_2$ также выпукло;
- в) если C_1, C_2 — выпуклые множества, то $\text{ri}(C_1 + C_2) = \text{ri } C_1 + \text{ri } C_2$.

Задача 8.7 (теорема Каратеодори). Пусть $S \subset A(V)$, $\dim \text{aff } S = k$. Докажите, что $\text{conv } S$ совпадает с множеством всех выпуклых комбинаций не более чем $k + 1$ точек из S .

Задача 8.8 (теорема Радона). Пусть $S = \{x_1, \dots, x_k\}$ — множество из $k \geq n + 2$ точек пространства $A(V)$, где $\dim V = n$. Тогда S можно представить в виде объединения $S = S_1 \cup S_2$ так, что $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, $\text{conv } S_1 \cap \text{conv } S_2 \neq \emptyset$.

Задача 8.9 (теорема Хелли). Пусть $(C_i)_{i \in I}$ — набор из $|I| \geq n + 1$ выпуклых множеств в $A(V)$, $\dim V = n$. Рассмотрим следующие утверждения:

- (1) любые $n + 1$ из множеств C_i имеют непустое пересечение;
- (2) все множества C_i имеют непустое пересечение.

а) Докажите, что если $|I| < \infty$, то (1) \Rightarrow (2).

УКАЗАНИЕ. Используйте индукцию по $|I|$ и теорему Радона.

б) Покажите на примере, что в случае $|I| = \infty$ импликация (1) \Rightarrow (2) уже неверна.

в) Докажите, что если все множества C_i замкнуты и хотя бы одно из них компактно, то импликация (1) \Rightarrow (2) справедлива без ограничений на I .

Задача 8.10. Пусть C_1, C_2 — выпуклые множества. Говорят, что гиперплоскость H *разделяет* C_1 и C_2 , если $C_1 \subset H_-$, $C_2 \subset H_+$ и хотя бы одно из множеств C_1, C_2 не содержится в H . Докажите, что разделяющая гиперплоскость существует в том и только том случае, когда $\text{ri } C_1 \cap \text{ri } C_2 = \emptyset$.

УКАЗАНИЕ. Рассмотрите выпуклое множество $C = C_1 - C_2$ и используйте задачу 8.6.

Задача 8.11. Пусть C_1, C_2 — выпуклые множества. Говорят, что гиперплоскость $H(a, b)$ *сильно разделяет* C_1 и C_2 , если для некоторого $\varepsilon > 0$ обе гиперплоскости $H(a, b - \varepsilon)$ и $H(a, b + \varepsilon)$ разделяют C_1 и C_2 .

а) Докажите, что гиперплоскость, сильно разделяющая C_1 и C_2 , существует тогда и только тогда, когда $\mathbf{0} \notin \overline{C_1 - C_2}$. УКАЗАНИЕ. Вначале рассмотрите случай, когда C_2 — точка.

б) Выберите, что для любых двух непересекающихся замкнутых выпуклых множеств, одно из которых компактно, существует сильно разделяющая гиперплоскость.