

## Дифференциал

Напомним, что **дифференциал** — линейная относительно  $\Delta x$  часть приращения функции.

$$df(x) = f'(x)dx \text{ или } f'(x) = \frac{dy}{dx}.$$

$$d(cu) = cdu; \quad d(uv) = vdu + udv; \quad df(u(x)) = f'(u) \cdot du(x).$$

$$d(u+v) = du + dv; \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2};$$

256. Составьте таблицу дифференциалов элементарных функций.

257. Найдите дифференциалы: а)  $d\left(3x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ ; б)  $d \log \sin x$ ; в)  $d\frac{x^2 + x}{x - 1}$ .

258. Найдите дифференциалы следующих функций:

$$\text{а) } y = \cos \sqrt{5x - \frac{\pi}{3}}; \quad \text{б) } y = e^{x^\alpha}; \quad \text{в) } y = x^2 \arccos x; \quad \text{г) } y = e^x \sin x.$$

## Первообразная

**Пример 1.** Координата тела меняется по закону  $s(t) = 5t^2 - 2t + 1$ . Найдите скорость и ускорение тела через 3 секунды.

**Пример 2.** На покоящееся тело массой 5 кг начинает действовать сила 10 Н. На какое расстояние переместится тело за 3 секунды?

Какой из двух примеров более естественен?

Определение. **Первообразной** для данной функции  $f(x)$ , заданной на некотором промежутке, называется функция  $F(x)$ , заданная на том же промежутке, производная которой равна  $f(x)$ .

Таким образом,  $F'(x) = f(x)$ . Другая запись:  $dF(x) = f(x)dx$ .

Процесс отыскания первообразных называется **интегрированием** функций.

Термин происходит от лат. "integrare" «восстанавливать», далее от "integer" «нетронутый, целый», из in- «не-, без-» + tangere «трогать, касаться».

**Пример 3.** Проинтегрируйте функции: а)  $f(x) = 2x + 3$ ; б)  $f(x) = \sin x$ .

Основное свойство первообразной. Если  $F(x)$  — первообразная для  $f(x)$  на некотором промежутке, то для любого числа  $C$  функция  $F(x) + C$  тоже является первообразной для  $f(x)$  на этом промежутке. Других первообразных у  $f(x)$  на этом промежутке нет.

Определение. Совокупность всех первообразных функции  $f(x)$  называют **неопределенным интегралом** этой функции и обозначают  $\int f(x)dx$ .

Таким образом,  $\int f(x)dx = F(x) + C$ , где  $F(x)$  — одна из первообразных функции  $f(x)$ , а  $C$  пробегает множество всех действительных чисел.

$f(x)$  называют **подынтегральной функцией**,  $f(x)dx$  — **подынтегральным выражением**,  $x$  — переменной интегрирования, а  $C$  — постоянной интегрирования.

Формулу  $\int f(x)dx = F(x) + C$  можно записать также в виде

$$\int F'(x)dx = F(x) + C \text{ или } \int dF(x) = F(x) + C.$$

Чтобы из бесконечного множества первообразных выделить одну, надо задать начальные условия.

**Пример 4.** Найдите первообразную  $F_0(x)$  для функции  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  на промежутке  $(0; +\infty)$ , принимающую значение 1 при  $x = 1$ .

**Пример 5.** Функции  $F(x)$  и  $G(x)$  являются первообразными для функций  $f(x) = (x+5) \ln(7-x)$  и  $g(x) = (x-2) \ln(x+4)$  соответственно. Сравните  $F(2)$  и  $G(4)$ , если  $F(3) = G(3)$ .

## Арифметические свойства неопределенного интеграла

1)  $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ . Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла.

2)  $\int(f(x) \pm g(x))dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$ . Интеграл суммы равен сумме интегралов, если они существуют.

Таблица основных интегралов

<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C;$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>	$\int \cos x dx = \sin x + C;$
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>	$\int \sin x dx = -\cos x + C;$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span>	$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C;$
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span>	$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C;$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span>	$\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C;$
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C;$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span>	$\int e^x dx = e^x + C;$		
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span>	$\int \frac{dx}{x} = \ln  x  + C;$		

*Простейшие примеры интегрирования*

1) $\int (x^4 - 6x^2 + 5x - 7) dx;$	2) $\int \frac{(x^2 + 5x - 7) dx}{\sqrt{x}};$	3) $\int \left( x \sqrt[3]{x} - \frac{6}{x^2} \right) dx;$
4) $\int (3 - x^2)^3 dx;$	5) $\int \left( \frac{1-x}{x} \right)^2 dx;$	6) $\int \frac{\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x^2} + 1}{\sqrt[4]{x}} dx;$
7) $\int \left( 1 - \frac{1}{x^2} \right) \sqrt{x} \sqrt[3]{x} dx;$	8) $\int \frac{x^2 dx}{1+x^2};$	9) $\int (1 + \sin x + \cos x) dx;$
10) $\int \frac{2^{x+1} - 5^{x-1}}{10^x} dx;$	11) $\int (2^x + 3^x)^2 dx;$	12) $\int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx.$
без номера) $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$		

259. Наименьшее значение первообразной для функции  $f(x) = x^2 + 10x + 28$  на отрезке  $[-5; -2]$  равно -15. Найдите ее наибольшее значение на этом отрезке.

*Домашнее задание*

260. Найдите дифференциалы следующих функций:

a) $y = 5x^3 - \frac{2}{x^3};$	в) $y = \sin 8x + \operatorname{tg} 2x;$	д) $y = (x^3 - 1)e^{x^3};$	ж) $y = x^2 \cos x;$
б) $y = 6\sqrt{x} + 2\sqrt[3]{x};$	г) $y = \frac{x}{1+x^2};$	е) $y = \log_2 \arcsin x;$	з) $y = \operatorname{arctg} \sqrt{x}.$

261. Точки  $K(3; 9)$  и  $T(3; -1)$  лежат соответственно на графиках функций  $y = F(x)$  и  $y = G(x)$ , являющихся первообразными для функции  $f(x) = \sqrt{3x} + 3 \ln(x-2)$ . Найдите расстояние между касательными к графикам, проведенными в этих точках.

262. При каких  $a$  уравнение  $x^2 + 2x + |4x - 4| = ax + 3$  имеет ровно 2 решения?

*Линейная замена переменной*

Если  $\int f(x) dx = F(x) + C$ , то  $\int f(kx+b) dx = \frac{1}{k} F(kx+b) + C$ .

13) $\int \frac{dx}{(x-2)^k}, k \neq 1;$	14) $\int \frac{dx}{x+2};$	15) $\int \cos 3x dx;$
16) $\int (2x-3)^{10} dx;$	17) $\int \sqrt[3]{1-3x} dx;$	18) $\int \frac{dx}{\sqrt{2-5x}};$
19) $\int \cos 7x \cos 4x dx;$	20) $\int \sin^2 3x dx;$	21) $\int \frac{dx}{x^2+4x+5}.$

Еще 4 табличных интеграла:

<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11</span>	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13</span>	$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left  \frac{x-a}{x+a} \right  + C;$
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span>	$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C;$	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14</span>	$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left  \frac{x+a}{x-a} \right  + C.$

Проинтегрируйте, используя табличные интегралы:

22)  $\int \frac{dx}{2+3x^2};$  23)  $\int \frac{dx}{2-3x^2};$  24)  $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}}.$